

## STOSOWANIE EPILADERM ENZYME COMPLEX

**W każdym dozowniku znajduje się około 90 pompek preparatu.**

Ilość pompek wskazana poniżej odnosi się do każdego preparatu z osobna.

Na przykład: 1 pompka = 1 pompka Enzyme Complex + 1 pompka Accelerator

### TABELA STOSOWANIA (aktualizacja w 2020 r.)

**Zalecana ilość dawek każdego z preparatów: Enzyme Complex oraz Accelerator**

Górna warga	½ pompki
Brwi	½ pompki
Podbródek	½ – 1 pompki
Pachy	2 – 4 pompek
Przedramię	3 – 4 pompek
Łydki	8 – 10 pompek
Całe nogi	10 – 12 pompek
Klatka piersiowa (mężczyźni)	4 – 6 pompek
Ramiona (mężczyźni)	4 – 6 pompek
Plecy (mężczyźni)	6 – 10 pompek
Brzuch (mężczyźni)	4 – 6 pompek
Pośladki	2 – 4 pompek
Klasyczne bikini	2 – 3 pompek
Bikini brazylijskie	4 – 6 pompek

### Dodatkowa informacja:

Aktywny kompleks enzymatyczny działa tylko na wydepilowane mieszki włosowe w fazie anagenowej (ponownego wzrostu). W związku z naturalnym, biologicznym cyklem wzrostu nie można osiągnąć/zagwarantować skóry w 100% wolnej od włosów.

Dodatkowe zabiegi oraz pielęgnacja skóry po depilacji może/powinna być konieczna.

Profesjonalna, głęboka depilacja jest warunkiem efektywności działania kuracji enzymatycznej. Zaleca się również wykonywanie zabiegów stopniowo na mniejszych obszarach.

### UWAGA:

1. Nie używać pudru przed depilacją woskiem lub pastą cukrową.
2. Nie używać preparatów z olejkami do oczyszczania skóry po depilacji woskiem lub pastą cukrową.
3. W celu oczyszczenia skóry po depilacji woskiem lub pastą cukrową używać letniej wody. Pozostawić skórę lekko wilgotną przed aplikacją preparatu enzymatycznego.
4. Po depilacji woskiem lub pastą cukrową nałożyć preparat **Enzyme Complex** (Phase 1) na wydepilowaną i oczyszczoną wodą skórę i wmasować przez 1 minutę.
5. Następnie nałożyć preparat **Accelerator** (Phase 2) i wmasować przez 1 minutę.
6. W przypadku depilacji dużych powierzchni np. całych nóg – podzielić na obszary tzn. wydepilować jedną łydkę woskiem lub pastą cukrową, oczyścić letnią wodą i natychmiast wmasować preparaty enzymatyczne. Następnie wykonać zabieg na drugiej łydce.